

**CRITERIOS DE PRIORIZACION REFERENCIA-CONTRARREFERENCIA
TRAUMATOLOGÍA ADULTO E INFANTIL. 2006**

UBI C	EDAD PAC	PATOLOGIAS SEGÚN TIPO PRIORIDAD						OBSERV
		GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	
EXTREM SUPERIOR	CUALQ EDAD	Fracturas expuestas Luxación codo/ muñeca/ mano/ hombro Fractura muñeca y/o huesos largos desplazada	Fractura muñeca y/o huesos largos no desplazada*	Disyunción acromioclavic. G° III	Disyunción acromioclavicular G° II (derivar a control c/ Rx hombro) Tendinitis y/o sinovitis no infecciosa	Fractura clavícula (a control c/ Rx) Disyunción acromioclavicular G° I (a control c/ Rx hombro AP)		*inmovilizar o reducir en SAPU y actuar como Grupo II **Si persiste dolor + de 24 hrs con tratamiento eficaz
	SOLO NIÑOS	Fractura supracondílea de codo	Fractura condílea codo Fractura antebrazo	Esguince mano** Fractura clavícula				*** inmov. en SAPU y actuar como grupo III
EXTREM INFERIOR	CUALQ EDAD	Fracturas expuestas Fractura cotilo/ cadera/ pelvis/ tobillo. Fractura huesos largos desplazada Luxación traumática de cadera/ rodilla	Fractura huesos largos no desplazada Esguince rodilla o tobillo G° III	Esguince rodilla/ tobillo grado II Rotura tendón Aquiles***		Esguince rodilla/tobillo G° I que no responde a tratamiento. ARTROSIS CADERA GES**** Meniscopatía rodilla Tendinitis y/o sinovitis no infecciosa	Hallux valgus Pie plano – cavo Ortejos en garra Artrosis cadera no GES Artrosis rodilla	**** GES (mayor 65 años)

	SOLO NIÑOS	Deslizamiento agudo cabeza fémur	Pie Bot en recién nacido	Esguince tobillo/rodilla**	Enfermedad Perthes	Pie talo lactante menor Pie Bot (mayor seis meses edad) Ortejos en garra lactante menor	Genu valgo- varo Poli y/o sindactilia	*** GES
COLUMNA	CUALQ EDAD	Fractura columna			Lumbociática	ESCOLIOSIS GES***	Lumbago cónico Cervicobraquialgia Escoliosis No GES	
OTRAS	CUALQ EDAD	Artritis séptica Osteomielitis aguda Heridas cortantes o contusas c/ compromiso nervio o tendón Contusión grave de extremidades en niño			Tumores óseos Enfermedad Perthes		Quiste sinovial	

GRUPO I = DERIVACIÓN A SERVICIO DE URGENCIA*
GRUPO II = ATENCIÓN EN TRAUMATOLOGIA EN 48 HORAS
GRUPO III = ATENCIÓN EN TRAUMATOLOGIA DENTRO DE 7 DIAS
GRUPO IV = ATENCIÓN EN TRAUMATOLOGIA ANTES DE 15 DIAS
GRUPO V = ATENCIÓN EN TRAUMATOLOGIA ANTES DE 30 DIAS
GRUPO VI = ATENCIÓN EN TRAUMATOLOGIA MAS DE 1 MES

LAS PATOLOGÍAS QUE SEAN CLASIFICADAS COMO GRUPO I ó II EN SERVICIO DE URGENCIA HBV, SE DERIVARÁN DIRECTAMENTE DE ESTE AL POLICLINICO DE LA ESPECIALIDAD; LOS OTROS TIPOS DE PATOLOGIA SE DERIVARAN A SUS RESPECTIVOS CONSULTORIOS, DESDE DONDE SE ENVIARAN A ESPECIALIDAD CON IC RESPECTIVA.